



FEDERAZIONE ITALIANA GRUPPI COLTIVATORI SVILUPPO
FEDERSVILUPPO
ASSOCIAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE

INIZIATIVA FINANZIATA AI SENSI DEL PSR 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTE
MISURA 1 - OPERAZIONE 1.2.1
AZIONE 1: "ATTIVITÀ DIMOSTRATIVE E DI INFORMAZIONE IN CAMPO AGRICOLO"

NOTA TECNICA VITICOLA

N. 09/18

DEL 20/06/2018

FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

(decreto ministeriale del 31/05/2000 "Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite")

Il primo trattamento insetticida può essere effettuato a partire dal 25-26 giugno

**IN OGNI CASO, SOLO DOPO LA FINE DEL
PERIODO DI FIORITURA DELLA VITE, AD ALLEGAGIONE AVVENUTA**

Per le aziende aderenti ai programmi agroambientali possono essere utilizzati:
Acetamiprid, Clorpirifos metil, Etofenprox, Thiamethoxam.

Occorre sempre rispettare le seguenti prescrizioni:

- Divieto trattamenti insetticidi in fioritura;
- Sfalci ed appassimento/asportazione della vegetazione sottostante nel caso di presenza di fioriture spontanee prima di eseguire i trattamenti insetticidi;
- Evitare fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento);
- Controllare il pH della soluzione in modo che sia inferiore a 7;
- Impiegare volumi di acqua e pressioni di distribuzione in grado di bagnare bene tutta la vegetazione;
- trattare tutti i filari da entrambi i lati;
- Cercare di fare arrivare la soluzione sulla pagina inferiore delle foglie, comprese quelle dei polloni;
- Evitare presenza di polloni o erbe infestanti troppo sviluppate alla base dei ceppi.

Dopo aver trattato con l'insetticida e trascorso il tempo di rientro (almeno 48 ore) estirpare le piante malate ed eliminare i tralci con sintomi: questo serve per togliere la fonte di fitoplasma che rende infettivo l'insetto vettore (scafoideo).



FEDERAZIONE ITALIANA GRUPPI COLTIVATORI SVILUPPO
FEDERSVILUPPO
ASSOCIAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE

INIZIATIVA FINANZIATA AI SENSI DEL PSR 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTE
MISURA 1 – OPERAZIONE 1.2.1
AZIONE 1: “ATTIVITÀ DIMOSTRATIVE E DI INFORMAZIONE IN CAMPO AGRICOLO”

Per i vigneti situati a distanze inferiori a 10 metri da aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili ed aree verdi di plessi scolastici, parchi gioco, strutture sanitarie)

devono essere adottati i seguenti accorgimenti:

- distribuire la miscela verso l'interno del vigneto
- utilizzare coadiuvanti antideriva
- non utilizzare cannoni per la distribuzione della miscela insetticida
- segnalare preventivamente alla popolazione l'esecuzione dei trattamenti con adeguata cartellonistica
- trattare nelle ore di minor frequentazione.

(A.5.6 del D.M. del 22 gennaio 2014 – Adozione del PAN per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari)

Referente tecnico:

Manuela Fassio zona di Chieri, tel. 011.9425745, manuela.fassio@coldiretti.it

Tecnico di riferimento:

Giuseppe Arbrile zona di Torino, Bussoleno, Rivoli, tel. 0116177275, giuseppe.arbrile@coldiretti.it

Marco Bottazzi zona di Pinerolo, tel. 0121.303629, consulenzafrutticola.to@coldiretti.it

Paolo Dotto zona di Caluso, tel. 011.9831339, paolo.dotto@coldiretti.it

Loretta Genisio zona di Rivarolo C.se, tel. 0124.428171, loretta.genisio@coldiretti.it